

РОЗПОДІЛ ХВОРИХ НА РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Акальцева А.І., студ. 2-го курсу

Науковий керівник – асист. Мадяр В.В.

Сумський державний університет, кафедра загальної хірургії

Десять років в Україні щорічно наростаючи палає епідемія туберкульозу. В 2003 р. захворюваність туберкульозом складала 77,6 на 100 тис. населення. Загалом на обліку в протитуберкульозних диспансерах стоїть 760 000 осіб. Кожен десятий хворий на туберкульоз страждає на розповсюджені його форми з масивним бактеріовиділенням. Із них 30% виділяють мікобактерію резистентну до протитуберкульозних препаратів, що створює додаткові складнощі, інколи непереборні, в лікуванні захворювання. Розподіл хворих за віковими групами та формами розповсюдженого туберкульозу легень:

Форма туберкульозу	До 20	20-29	30-39	40-49	50-59	За 60	Усього
Циротичний	2		8	7	10	1	28
Туберкуломи	2	14	24	18	17	3	78
Інфільтративний	1	22	28	20	11	3	85
Дисемінований		10	7	17	4		38
Фіброзно-кавернозний	3	16	46	38	23	1	127
Кавернозний	3	12	9	16	4	1	45
Всього	11	74	122	116	69	9	401
%	2,74	18,5	30,4	28,9	17,2	2,24	100

Обстежено нами 401 хворий на розповсюджений туберкульоз легень. Із них 80,56% складали хворі працездатного віку до 50 років і 97,76% до 60 років (див. табл.). Наведені дані свідчать про актуальність своєчасного виявлення та лікування пацієнтів з розповсюдженим туберкульозом легень, та санації епідеміологічних вогнищ інфекції.